Exames Hormonais em indivíduos Transgêneros

DR^a MILENA CABRAL

PROFESSORA & BIOQUÍMICA

CRF-BA 4932

Palestra:

Exames hormonais em indivíduos transgêneros

Palestrante:

Milena Cabral
Brasil

Escaneie o QR Code ou acesse o link para participar como convidado:

<https://conferenciaweb.rnp.br/sala/fiavia-103>

Data: 20 de março 2025
Às 12:00 h (horário de Brasília)
Às 15:00 h (horário de Portugal)

Dados epidemiológicos e conceitos

- As Nações Unidas no Brasil alertam que a expectativa de vida de uma mulher trans não ultrapassa os 35 anos na América Latina.
- Têm necessidades de cuidados da saúde bastante específicos, sendo que as maiores dificuldades encontradas são:

Falta de acesso e acolhimento

Desrespeito ao nome social e pronomes de escolha

Atitudes discriminatórias e **DESCONHECIMENTO** pelos profissionais da saúde

Interpretação equivocada dos exames comprometendo condutas farmacológicas e atraso no tratamento.

Parece que todos já sabem; mas não: o óbvio ainda precisa ser dito.

Parece que todos já sabem; mas não: o óbvio ainda precisa ser dito.

Indivíduo Transgênero: Os indivíduos transgênero **não** se identificam com o sexo biológico designado ao nascimento e **alguns** dentre eles buscam assistência médica para intervenções que visam afirmar fenotipicamente o gênero de identidade.

Identidade de gênero: Refere-se à experiência de uma pessoa com o gênero com o qual se identifica.

Parece que todos já sabem; mas não: o óbvio ainda precisa ser dito.

Homem Trans: Um homem transgênero é alguém cujo sexo biológico, designado ao nascimento era feminino, mas que se identifica e vive como alguém do gênero masculino.

Mulher Trans: Uma mulher transgênero é alguém cujo sexo biológico, designado ao nascimento, era masculino, mas que se identifica e vive como alguém do gênero feminino.

Parece que todos já sabem; mas não: o óbvio ainda precisa ser dito.

Disforia de gênero: Condição caracterizada por **identificação forte e persistente com o gênero oposto**; tais pessoas frequentemente acreditam que são vítimas de um acidente biológico e estão aprisionadas em um corpo incompatível com sua identidade de gênero subjetiva. É o **sofrimento psicológico** que pode acompanhar a incongruência entre o gênero experienciado e o gênero atribuído à nascença.

- Não-binaridade: não identificação do sujeito como binário; ou seja, enquanto homem ou mulher.
- Nome Social: nome escolhido pelo indivíduo para representar sua identidade e seu gênero.

Qual o papel do laboratório de Análises Clínicas nesse contexto?

Neste caso, o apoio do laboratório clínico é fundamental para o acompanhamento da segurança e da efetividade da terapia hormonal.

Os tratamentos voltados para a afirmação do gênero visam:

- alinhar as características físicas à identidade de gênero
- e para tal são utilizados hormônios sexuais exógenos e anti-andrógenos.

O apoio do laboratório, assim como o entendimento de toda a equipe multiprofissional vai ser fundamental para uma melhor interpretação e liberação dos exames, assim como auxiliará:

- no acompanhamento,
- na segurança e
- na efetividade da terapia,
- objetivando um cuidado da forma mais ideal possível.

Até porque, para quem está em terapia hormonal, os dados sobre os INTERVALOS DE REFERÊNCIAS LABORATORIAIS SÃO AINDA LIMITADOS.

Daí a importância de nós analistas, sabermos interpretar para liberarmos laudos com confiabilidade e melhor orientá-los.

E qual é o objetivo desta terapia hormonal?

- A terapêutica hormonal na pessoa trans visa **reduzir o nível hormonal endógeno e manter níveis hormonais compatíveis com aqueles do gênero oposto**, de forma a promover o surgimento das **características sexuais secundárias do gênero desejado** e amenizar as do sexo biológico.

Quais exames laboratoriais são os mais solicitados para o Homem Trans?

Quais exames laboratoriais são os mais solicitados para o Mulher Trans?

Testosterona
total

LH

FSH

Estradiol

Prolactina

Além dos hormônios para monitoramento da Hormonização, comorbidades secundárias, podem acontecer. O que você deve analisar?

Marcadores metabólicos, como perfil lipídico e glicídico
(associados com as DCVs)

Marcadores
inflamatórios

Marcadores do
distúrbio
hidroeletrolítico

Marcadores
ósseos

Marcadores
tumoriais*

**Portanto, qual
o objetivo de
se realizar
exames
laboratoriais?**

Avaliar e monitorar efeitos adversos

Avaliar e monitorar o
desenvolvimento dos caracteres
sexuais

Avaliar e monitorar os riscos
cardiovasculares

O que encontramos de achados laboratoriais, na Mulher Trans que faz hormonização?

A testosterona total permanece dentro do intervalo de referência para mulheres cisgênero ou em faixa intermediária.

Mas com 3 meses os sinais e sintomas da feminização começam a acontecer: perda de massa muscular, por exemplo.

O estradiol permanece dentro do intervalo considerado para a fase folicular de mulheres cisgênero (20-200pg/mL).

Hemograma após 6 meses de hormonioterapia feminizante: caem para intervalo de referência para mulheres cisgênero.

O que encontramos de achados laboratoriais, na Mulher Trans que faz hormonização?

Triglicerídeos e HDL elevados. LDL-c diminuído.

Pode diminuir cálcio, albumina e fosfatase alcalina.

A testosterona tem efeito anabólico no osso, aumentando a atividade dos osteoblastos.

PSA*: na privação androgênica, vai ser menor do que o valor para a idade, no intervalo de referência de homens cisgêneros.

Entretanto, efeitos adversos podem ocorrer como ganho de peso, ***piora da resistência insulínica***, elevação da pressão arterial, além de ***aumento de marcadores inflamatórios e protrombóticos***.

Hiperprolactinemia também foi descrita, geralmente com altas doses e por tempo prolongado.

REVIEW

Figure 1. Effects of estrogen and antiandrogen treatment in transgender women. [Reproduced with permission from Tangpricha V, den Heijer M. Estrogen and antiandrogen therapy for transgender women. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2017;5:291–300. (41); ©2019 Illustration Presentation ENDOCRINE SOCIETY].

Psychological and CNS

- ↓ Gender dysphoria
- ↓ Anxiety
- ↓ Depression
- ↓ Perceived stress
- ↑ Quality of life

Breast

- ↑ Breast tissue

Skin

- ↑ Softness
- ↓ Sebum and acne

Reproductive system

- ↓ Penile erections
- ↓ Prostate size
- ↓ Sperm count and quality

Body composition

- ↓ Lean mass
- ↑ Fat mass
- ↑ Visceral fat

Sexual health

- ↓ Sexual desire

Hair

- ↓ Facial and body hair
- ↓ Male pattern baldness

Voice

- No change

Blood pressure

- ↓ Systolic blood pressure

Blood

- ↓ Hemoglobin and hematocrit

Lipids and metabolism

- ↑ LDL cholesterol
- ↑ Triglycerides
- ↑ Sex hormone-binding globulin

Hormone concentrations

- ↓ Testosterone
- ↓ Luteinising hormone
- ↓ Follicle-stimulating hormone
- ↑ Prolactin

O que encontramos de achados laboratoriais, no Homens Trans que faz hormonização?

Testosterona pode manter-se dentro do intervalo de referência para homens cisgênero, ou intermediário.

O hemograma apresenta-se com aumento para intervalo de referência do homem cisgênero. E a creatinina, CK também elevam-se.

Aumento das enzimas hepáticas, Triglicerídeos, com diminuição do HDL.

Os efeitos surgem em **1 a 6** meses após início do tratamento hormonal e se completam em até 5 anos.

Psychological and CNS

↓Gender dysphoria
↓Anxiety
↓Depression
↓Perceived stress
↑Total grey matter volume
↑Cortical thickness in several areas

Hair

↑Facial and body hair
↑Hair density, diameter, and growth rate
Alopecia

Breast

↓Breast cancer
↓Glandular tissue
↑Fibrous connective tissue

Reproductive system

Cessation of menstruation and infertility
↑Clitoral size
↓Vaginal epithelium thickness
Atrophic endometrium (according to data from some studies)
Ovarian hyperplasia and polycystic ovaries

Body composition

↑Sexual desire

Skin

Acne

Voice

↓Pitch

Muscle

↑Lean mass
↑Cross-sectional area
↑Bodyweight
↑Grip strength

Blood pressure

↑Systolic blood pressure

Blood

↑Hemoglobin and hematocrit

Lipids and metabolism

↓HDL cholesterol
↑Triglycerides
↓Sex hormone-binding globulin

Hormone concentrations

↓Estradiol
↓Luteinising hormone
↓Follicle-stimulating hormone
↓Prolactin

Figure 2. Effects of testosterone treatment in transgender men. [Reproduced with permission from Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2017;5: 301–311. (110); ©2019 Illustration Presentation ENDOCRINE SOCIETY].

Saúde óssea : Atualmente não há estudos que sugerem que o início do tratamento hormonal deva ser uma indicação para realizar o rastreio avançado de osteoporose. No entanto, a International Society for Clinical Densitometry e a Endocrine Society sugerem que se deve considerar uma avaliação da DMO antes do início da terapêutica.

Estradiol

Diminui atividade osteoclástica favorecendo apoptose e ativa osteoblastos.

Testosterona

Aumenta o tempo de vida dos osteoblastos e diminui a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea.

Saúde óssea : As recomendações da International Society for Clinical Densitometry afirma que a DMO está indicada em pessoas transgênero submetidas a:

Onde você, pode se “confundir”, na hora de interpretar exames laboratoriais?

Indivíduo Trans COM
hormonização

Indivíduo Trans SEM
hormonização

Pacientes que estão fazendo a hormonização: quais riscos podem ser percebidos, e quais exames críticos devem ser informados?

- Os esteroides sexuais causam interferência no resultado do hemograma: principalmente - Hb, Ht.
- Esta poliglobulia aumenta a viscosidade do sangue e, conseqüentemente, o risco de trombo e daí, a necessidade de monitoramento.
- Mas não só isso: a Testosterona tem ação pró-coagulante devido ao **aumento da atividade de receptores de Tromboxano A**, o qual ao ser ativado, desencadeia a cascata de coagulação.

Os andrógenos estimulam a eritropoese; porém, se usar concentrações mais baixas de testosterona, a elevação do Hematócrito e da Hemoglobina é menor.

E o acompanhamento laboratorial?

- **Avaliação inicial:** hemograma, função renal, hepática, eletrólitos, perfil glicídico e lipídico, sorologias para ISTs, FSH, LH, estradiol, testosterona e prolactina (para casos de mulheres TRANS).
- **Semestral:** tudo acima menos a sorologia.
- **Rastreamento de neoplasias:**
 - homem TRANS: USG pélvica e colpocitologia oncológica até realizar a histerectomia. Mamografia até realizar a mastectomia.
 - mulheres TRANS: dosagem do PSA após os 50 anos e mamografia anualmente.

E o acompanhamento laboratorial?

- **Mulher Trans:** os níveis plasmáticos de testosterona devem ser **inferiores a 50 ng/dL** e o estradiol plasmático que deve estar entre **100-200 pg/mL**. Se usar espironolactona (como bloqueador de andrógenos) deve monitorar eletrólitos e marcadores de função e lesão renal.
- **Homem Trans:** . A testosterona total plasmática deve ser medida a cada 3 meses até que se encontrem dentro do intervalo fisiológico dos homens cis. A concentração de testosterona plasmática deve ser avaliada a meio do ciclo entre administrações com um alvo de **300-800 ng/dL**.

Como não existem intervalos de referência específicos para indivíduos transgênero estabelecidos (ainda), deve avaliar se o paciente está em terapia hormonal ou não.

Se NÃO ESTIVER EM TERAPIA

- use o sexo atribuído no nascimento para interpretar os resultados laboratoriais.

Se ESTIVER EM TERAPIA

- use intervalos de referência de homem cisgênero adulto para homens transgêneros ou pessoas em terapia masculinizante;
- use intervalos de referência de mulheres cisgêneros adultas para mulheres transgênero ou em terapia de feminização.

Qual o racional por detrás da importância de se saber avaliar um resultado alterado, no público TRANS?

O que alguns trabalhos científicos sugerem, devido à ausência de intervalo de referência?

- Relatar intervalos de referência masculinos e femininos para todos os testes com faixas específicas de cada sexo.
- Isso permitiria profissionais de saúde e pacientes a terem maior flexibilidade quando interpretar resultados de testes e seria particularmente valioso para pessoas nos estágios iniciais da terapia hormonal.

Cuidado centrado no Paciente Transgênero

Atendimento Pré-analítico

- Uso do nome social e dos pronomes de preferência;
- Uso de medicamentos para hormonização.

Atendimento Pós-analítico

- Intervalos de referência: sexo biológico ou ambos os sexos, ou específicos para o gênero;
- **Laudos: com nome social e gênero congruente.**

Como a recepção e a área técnica do laboratório s podem otimizar o atendimento e evitar falhas?

- A identificação dos pacientes devem vir conforme preconiza a OMS: usando a dupla identificação em todas as etapas (nome social e nome civil).
 - Além disso, o sexo biológico deve vir linkado ao intervalo de referência porém, ocultado no laudo.
 - O gênero pelo qual o paciente se identifica deve vir visível no laudo;
 - Seria interessante vir a informação da hormonização e/ou da intervenção cirúrgica (presença ou ausência de órgãos como: próstata, útero, mamas, ovários) no cadastro.
-
- *“Como quer que te chame”?*

Como a recepção e a área técnica do laboratório podem otimizar o atendimento e evitar falhas?

Praticando a ESCUTA ATIVA!

**ABDICANDO-SE DO PRECONCEITO;
Trabalhando de forma PROFISSIONAL.**

Referência bibliográficas

- Posicionamento Conjunto. Medicina Diagnóstica Inclusiva: cuidando de pacientes transgênero. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial; Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia; Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2019-2020.
- Guy T'Sjoen et al. Endocrinology of Transgender Medicine. *Endocrine Reviews*, February 2019, 40(1):97–117.
- I. Velho et al. Effects of testosterone therapy on BMI, blood pressure, and laboratory profile of transgender men: a systematic review. *Andrology*, 2017, 5, 881–888.
- Evelien T.M. Boekhout-Berends et al. Changes in laboratory results in transgender individuals on hormone therapy: a retrospective study and practical approach. *European Journal of Endocrinology*, 2023, Vol. 188, No. 5.

PROFAMILACABRAL

- @profamilacabral
- www.milacabral.com.br
- Papo com Profa. Mila Cabral
- dramilacabral@outlook.com

Obrigada!